

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
препарата
ВИПРОСАЛ В®

Регистрационный номер:

Торговое название: ВИПРОСАЛ В®

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Международное непатентованное или группировочное название:
Камфора + Салициловая кислота + Скипидар живичный + Яд гадюки &

Состав

1 г мази содержит:

действующие вещества: 0,05 МЕД (мышинных единиц действия) яда гадюки обыкновенной сухого, 30 мг камфоры рацемической, 30 мг скипидара живичного и 10 мг салициловой кислоты;

вспомогательные вещества: вазелин, цетостеариловый спирт, парафин твердый, натрия цетилстеарилсульфат, глицерол, натрия хлорид и вода очищенная.

Описание

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом камфоры и скипидара.

Фармакотерапевтическая группа

местнораздражающее средство природного происхождения.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства

Болеутоляющая мазь с ядом гадюки. Обладает местнораздражающим и болеутоляющим действием. Вызывает раздражение чувствительных рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей.

Показания к применению

Невралгии, артралгии, миозиты.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам мази, повреждения кожных покровов, кожные заболевания (в том числе аллергического и бактериального генеза), лихорадочные состояния, туберкулез легких, нарушения мозгового и коронарного кровообращения, склонность к возникновению ангиоспазмов, тяжелые нарушения функции почек и печени, общее истощение.

Детский возраст до 12 лет.

Беременность и период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Применяется наружно у взрослых и детей старше 12 лет.

В зависимости от величины кожной поверхности на болезненный участок наносят маленькими порциями 5-10 г (1-2 чайные ложки) мази и втирают в кожу в зависимости от интенсивности боли 1-2 раза в сутки до исчезновения болевого синдрома. Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания. При сохранении симптомов болезни после 14-дневного лечения проконсультируйтесь с врачом.

Побочные действия

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, отек или крапивница.

Во избежание побочных явлений рекомендуем предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.

Передозировка

Не отмечалась.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Не известны.

Особые указания

При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу.

При случайном попадании на слизистые оболочки мазь вызывает сильное раздражение.

После применения мази необходимо тщательно вымыть руки, чтобы избежать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

При попадании мази в глаза и на слизистые оболочки необходимо обильно промыть их водой.

Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения, по 30 г или 50 г в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из полиэтилена или полипропилена. Тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не хранить в холодильнике и морозильной камере.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Владелец регистрационного удостоверения

АО „Гриндекс”

Ул. Крустпилс 53, Рига, LV – 1057, Латвия

Производитель

АО Таллиннский фармацевтический завод

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония

Представительство в Москве

123242, Москва, ул. Б.Грузинская, д.14, комната правления 2,

тел. в Москве (495) 771 65 05

Организация, принимающая претензии: представительство в Москве

Директор АО Таллиннский
фармацевтический завод

Р.Унт

И.о. директора ИДКЭЛС

А.Н.Васильев